Mémoire.

Sur un Ver vivant trouvé dans un Abcéa a la Cuisse le 15. feuvrier 1748.

Je fus appellé le vendredy 2 feuvrier 1748. pour voir Nicolas Desjardins rüe de la Verrerie qui sortoit a ce qu'il me dit d'une fievre occasionnée par une indigestion, en consequence il avoit eté seigné deux fois beaucoup lavé, et purgé deux fois. quelques jours aprés la seconde medecine, il sentit une douleur a Laine gauche; s'imaginant que c'etoit une hernie, il se fit faire un bandage, qui faisoit plusieurs circulaires autour du corps et de la cuisse avec des nœuds d'embaleurs sur laine serrés a un point qu'ils gênoient prodigieusement la Circulation, et qui quóy qu'il me dit, qu'il n'y avoit pas longtems qu'il etoit fait; avoit deja causé une inflammation considerable dans toutte la cuisse. Tel etoit l'état ou je trouvai le Malade en arrivant chez luy.

Ayant vü la partie je commencai par lever promptement le Bandage et j'examinai s'il y avoit effectivement quelque hernie, n'y en ayant point trouvé toutte mon attention fut de combatre l'inflammation

ARC 42 n° 60

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

causée, ou du moins bien augmentée par le bandage —
imprudemment serré, j'employé pour cet effet la Seignée,
Les Cataplasmes et fomentations emollientes, la diette
et les ptisannes delayantes. Quelques jours aprés je —
m'apperçus bien que je tentois infructueusement la resolution,
puisque la Fievre la Douleur et la tention de toutte la
Cuisse augmentoient. C'est pourquoy je rendis aussytôt les
cataplasmes plus maturatifs, pour detendre plus promptement
la partié et je ne tardai pas a en voir l'effet. Le lendemain —
je m'apperçu d'une fluctuation bien marquée a la partie —
Superieure et anterieure de la Cuisse sans beaucoup de —
diminution de Fievre n'y de Douleur. cela me fit penser que
La maladie seroit dangereuse, et je crus ne devoir rien —
entreprendre sans les conseils d'un Maitre de l'Art et que
le Malade ne fut pourvu du Spirituel. —

Je priai donc Mr. Bourru homme prudent et eclairé —
sous lequel j'ay travaillé pendant cinq ans, de vouloir —
m'accompagner dans cette operation. Nous nous y transportames
le Mercredy 7 fevrier, ou aprés avoir examiné le Malade
Nous avons jugé l'operation trés necessaire. Je fis donc —
L'incision depuis la partie superieure de la Cuisse jusqu'a la
partie moyenne, d'ou il en sorti au moins une pinte d'un
pus sereux. Cette ouverture me fis appercevoir qu'il y avoit
une destruction generale de tout le Tissu Celullaire par le pus
qui y abordoit en pressant la cuisse de toutte part. je craignois

même qu'il n'y eu communication au bas ventre, parceque Le foyer alloit jusqu'à l'arcade de ces muscles —

Le peu de Calme qui succeda l'operation ne dura pas longtems, l'inflammation, le gouflement et la douleur — survenüe a la jambe occasionnée probablement par le — sejour du pus dans les parties laterales et posterieures de la Cuisse n'a pas tardé a replonger le Malade dans de nouveaux accidents, ce qui m'a determiné le mardy 13. dudit mois a faire en presence du même Maitre une — contre ouverture a la partie laterale externe, et un peu posterieure de la cuisse depuis deux travers de doigts au bas du grand Trocanter jusqu'a 4 travers de doigt au dessus du Condile externe; d'ou il en sorti autant de pus et de — la même qualité qu'a la première. Cette contre-ouverture a beaucoup degorgé la cuisse, mais l'Inflammation, le Gouflement et la Douleur de la jambe, ont subsisté — malgré la situation la plus avantageuse, et les topiques les plus convenables, ce qui annoncoit une supuration prochaine, qui parut effectivement le lendemain dans toutte la jambe, mais plus marquée aux parties Laterales. J'en proposai l'ouverture a la qu'elle le Malade et les assistants s'opposerent, et le pus ne — tarda pas a se procurer une issue par la déstruction du tissu Celullaire des environs de l'articulation du Genoüil,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ou il y avoit ouverture, ce qui degorgéa de jour en jour la jambe. —

Au second pencement de la dernière ouverture, il sortit avec une grande quantité de pus un ver de huit pouces et une Ligne de longueur, et de huit lignes de Circonference, ce qui effraya le Malade et les assistants qui le voyant remuer, penserent s'evanouir, si je ne les eut rassuré.

Ce Ver paroit par sa construction etre de la nature des vers Lombricaux qui se trouvent assés communement dans les Intestins, sa couleur etoit d'un rouge bien pâle, ayant deux lignes paralleles une de chaque coté, beaucoup plus rouges, et qui s'etendoient dans toutte la longueur du Ver. — L'Espace entre ces deux lignes paroissoit approcher plus du blanc que de toutte autre couleur; il etoit composé comme sont ordinairement ces especes de vers, de plusieurs anneaux circulaires appliqués les uns contre les autres. je ne m'attacherai point a expliquer si cet insecte s'est formé dans la partie ou comment il y est parvenu, et s'il y a resté longtems, cela me paroit souffrir de trop grandes difficultés. —

J'ay continué de penser le Malade deux fois par jour avec le digestif animé, et l'emplatre de Stirax, parceque la pourriture et la supuration etoient fort grandes, et que les teguments etoient entierement separés du corps des muscles par la déstruction du tissu celullaire, comme je l'ay

deja dit; Dela il s'en suit necessairement leur corruption puisque la plus grande partie des vaisseaux destinés a leur porter la nourriture etoient rompus, ce qui arriva effectivement; Les ouvertures se grandirent de jour en jour et de prés d'un demi pied de distance qu'il y avoit entre les deux, elles furent au bout de dix jours reduites en une. il s'y est encore formé deux autres ouvertures sur le trajet des muscles triceps, une a leur insertion, et l'autre environ vers leur partie moyenne superieure. Quelques jours aprés malgré les injections detersives que je ne manquois point d'y faire chaque pensement, il en parut trois autres, une a la partie Laterale interne du Genöuil, une au jaret, et l'autre a la partie laterale interne et Superieure de la jambe, qui au bout de trois jours ont eté reduites en une; La Supuration fut toujours abondante et le pus dans la suitte devint plus Lié et d'une couleur blanche, tirant sur le bleu. Il n'est arrivé jusque la aucun accident extraordinaire au Malade, lorsquil me dit qu'il ne pouvoit plus subsister chez luy, et quil prenoit le party d'aller a L'hotel-Dieu, il s'y fit transporter le 6. mars ou il est mort le 4.e jour, n'en ayant point eté informé a tems, je n'ay pu proceder a l'ouverture du Cadavre, qui auroit pu fournir de nouvelles decouvertes sur ce phœnomene extraordinaire.

Berthier

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No 52